

## Nizoral szampon przeciwłupieżowy 6 ml x 6 sasz



Cena: 17,49 PLN

### Opis słownikowy

Dostępność	Dostępny w aptece w 24h
Opakowanie	6 sasz
Postać	Szampony
Producent	MCNEIL
Rodzaj rejestracji	Lek

### Opis produktu

#### Skład

Substancja czynna: 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Substancje pomocnicze: sól sodowa eteru laurylosulfonowego, sól disodowa eteru monolauriosulfonobursztynowego, dietylamid kwasu tłuszczowego oleju kokosowego, laurdimonium-zhydrolizowany zwierzęcy kolagen, dioleinian metyloglukozy makrogolu 120, kwas solny, chlorek sodu, substancje zapachowe, wodorotlenek sodu imidurea, erytrozyna sodowa (E 127), woda oczyszczona.

#### Wskazania i działanie

- Lek Nizoral® szampon leczniczy, 20mg/g wskazany jest w leczeniu i profilaktyce następujących chorób skóry: łupież skóry głowy (złuszczenie się naskórka skóry owłosionej głowy w postaci białych łatwo oddzielających się łusek); łojotokowym zapaleniu skóry (brązowo-czerwone plamy na klatce piersiowej i na twarzy, które złuszczą się w postaci białych lub żółtych łusek; łupieżu pstrym (małe, białe plamki na skórze klatki piersiowej).

Pochodna imidazolu, lek przeciwgrzybiczy w postaci preparatu do stosowania miejscowego. Hamuje biosyntezę ergosterolu, niezbędnego do budowy błony komórkowej grzyba, co powoduje zmiany jej przepuszczalności i prowadzi do obumarcia komórki. Ketokonazol działa na dermatofity, drożdżaki (m.in. Pityrosporum ovale) oraz grzyby dimorficzne. Wchłanianie przez skórę zachodzi w niewielkim stopniu. Lek nie przenika do krwi i nie wywiera działania układowego. Szampon szybko usuwa świąd i łuszczenie się skóry, zmniejsza przetłuszczanie się włosów i skóry głowy. Wywiera działanie przeciwgrzybicze jeszcze przez kilka dni po umyciu włosów.

#### Dawkowanie

Szampon Nizoral® w łupieżu zwykłym i łojotokowym zapaleniu skóry stosuje się w następujący sposób:

Okres leczniczy - 2 razy w tygodniu przez 2-4 tygodnie: 1. Nanieść niewielką ilość szamponu na zainfekowaną skórę (włosy mogą być uprzednio umyte normalnym szamponem). 2. Używając niewielkiej ilości wody, rozprowadzić szampon równomiernie na skórze. W przypadku długich włosów wystarczy umyć jedynie skórę głowy. 3. Wcierać szampon w skórę aż do uzyskania piany. 4. Pozostawić pianę na około 5 minut, a następnie spłukać. 5. Na co dzień można używać zwykłego szamponu. Profilaktyka - raz na dwa tygodnie, tak jak w okresie leczniczym. Stosowanie szamponu Nizoral® w łupieżu pstrym: Okres leczniczy - raz dziennie przez 5 dni. Profilaktyka -

przed okresem letnim raz na dobę przez 3 kolejne dni.

**Przeciwwskazania**

Leku Nizoral®; szampon leczniczy, 20mg/g nie należy stosować u osób ze stwierdzoną nadwrażliwością na ketokonazol lub którykolwiek składnik leku. Nadwrażliwość na lek objawia się zaczerwienieniem i swędzeniem skóry w miejscu kontaktu szamponu ze skórą.

**Informacje dodatkowe**

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Służymy Państwu pomocą pod adresem [apteka@tanie-leczenie.pl](mailto:apteka@tanie-leczenie.pl).