

Vicks AntiGrip max x 10 sasz o smaku pomarańczowym



Cena: 17,19 PLN

Opis słownikowy

Dostępność	Dostępny w aptece w 24h
Opakowanie	10 sasz
Postać	Proszki
Producent	TEVA
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Paracetamol, Fenylephrini hydrochloridum

Opis produktu

Składniki

Substancjami czynnymileku są: paracetamol, fenylefryny wodorowinian i chlorfenaminy maleinian.
Substancje pomocnicze to: mannitol, sacharyna sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, powidon K30, aromat pomarańczowy PHS 132958.

Zawartość w 1 saszetce leku:

Paracetamol 1000 mg
Fenylefryny wodorowinian 16 mg
Chlorfenaminy maleinian 4 mg

Masa netto

Zawartość opakowania: 10 saszetek

Charakterystyka

Vicks SymptMed Max to połączenie paracetamolu – substancji przeciwgorączkowej i przeciwbólowej, fenylefryny – substancji zmniejszającej obrzęk błony śluzowej nosa i chlorfenaminy – substancji przeciwhistaminowej, zmniejszającej ilość wydzieliny z nosa.

Preparat polecany jest w leczeniu objawowym przeziębienia i grypy, przebiegającym z gorączką, słabym lub umiarkowanym bólem (np. bólem głowy, gardła, mięśni), obrzękiem błony śluzowej nosa z tworzeniem wydzieliny.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować u dzieci i osób w podeszłym wieku. Nie należy stosować u kobiet w ciąży oraz karmiących piersią.

Stosowanie

Dorośli: jedna saszетка co 6 - 8 godzin. Nie należy stosować więcej niż 4 saszетки w ciągu doby.

U pacjentów dorosłych o masie ciała poniżej 50 kg, pacjentów z zespołem Gilberta (rodzinna żółtaczka niehemolityczna), pacjentów odwodnionych, długotrwale niedożywionych lub pacjentów z przewlekłą chorobą alkoholową należy stosować następujący schemat dawkowania: jedna saszетка 2-3 razy na dobę w odstępie czasu 6-8 godzin.

Pacjenci z łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby:

Nie należy przyjmować więcej niż 2 g paracetamolu (2 saszетки Vicks SymptoMed Max) na dobę, zachowując minimalnie 8-godzinny odstęę pomiędzy przyjmowanymi dawkami.

Pacjenci z niewydolnością nerek:

Ze względu na zawartą dawkę paracetamolu lek ten jest wskazany dostosowania w tej grupie pacjentów.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Producent

Laboratorios Alcalá Farma, S.L.
Ctra. M-300, km 29,920
28802 Alcalá de Henares
Madryt
Hiszpania

Skład

Substancjami czynnymi leku są: paracetamol, fenylefryny wodorowinian i chlorfenaminy maleinian.

Substancje pomocnicze to: mannitol, sacharyna sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, powidon K30, aromat pomarańczowy PHS 132958.

Zawartość w 1 saszette leku:

Paracetamol 1000 mg
Fenylefryny wodorowinian 16 mg
Chlorfenaminy maleinian 4 mg

Wskazania i działanie

Leczenie objawowe przeziębienia i grypy, przebiegających z gorączką, słabym lub umiarkowanym bólem (np. bólem głowy, gardła, mięśni), obrzękiem błony śluzowej nosa z tworzeniem wydzieliny.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Vicks SymptoMed Max

- Jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- Jeśli pacjent ma nadciśnienie tętnicze
- Jeśli u pacjenta występuje nadczynność tarczycy
- Jeśli pacjent ma jakąkolwiek ciężką chorobę serca lub tętnic (taką jak choroba wieńcowa)
- Jeśli u pacjenta stwierdzono tachykardię (zbyt szybkie bicie serca)
- Jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek
- Jeśli pacjent ma jaskrę
- Jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby
- Jeśli pacjent leczony jest lekiem z grupy inhibitorów monoaminoooksydazy, (IMAO) (takimi jak niektóre leki przeciwdepresyjne lub leki stosowane do leczenia choroby Parkinsona) oraz w okresie 15 dni po ich odstawieniu
- Lek jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci, ze względu na dużą dawkę paracetamolu

Vicks SymptoMed Max jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci ze względu na dużą dawkę paracetamolu

Dawkowanie

Zawartość jednej saszетки rozpuścić w niewielkiej ilości gorącej, lecz nie wrzącej wody (najlepiej w połowie szklanki wody). Pozostawić do ostygnięcia i uzyskania temperatury odpowiedniej do picia.

Dorośli: jedna saszетка co 6-8 godzin. Nie należy stosować więcej niż 4 saszетки w ciągu doby.

U pacjentów dorosłych o masie ciała poniżej 50 kg, pacjentów z zespołem Gilberta (rodzinna żółtaczka niehemolityczna), pacjentów odwodnionych, długotrwale niedożywionych lub pacjentów z przewlekłą chorobą alkoholową należy stosować następujący schemat dawkowania:

jedna saszetka 2-3 razy na dobę w odstępie czasu 6-8 godzin.

Pacjenci z łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby:

Nie należy przyjmować więcej niż 2 g paracetamolu (2 saszetki Vicks SymptoMed Max) na dobę, zachowując minimalnie 8-godzinny odstęp pomiędzy przyjmowanymi dawkami.

Więcej informacji znajduje się w ulotce dostępnej w zakładce Załączniki.

Informacje dodatkowe

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Służymy Państwu pomocą pod adresem apteka@tanie-leczenie.pl.